

# ENTEROSGEL®

Méregtelenítő készítmény

**Gyomor-bélrendszeri adszorbens akut hasmenés vagy hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma esetén történő alkalmazása**

## A BETEGTÁJÉKOZTATÓ TARTALMA

1. Mi az ENTEROSGEL®, és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az ENTEROSGEL®-t?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Az ENTEROSGEL® tárolása
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

## 1. MI AZ ENTEROSGEL®, ÉS MIYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

**Az ENTEROSGEL® orális szuszpenzió az alábbiak tüneti kezelésére szolgál:**

- akut hasmenéses megbetegedések,
- hasmenéssel járó irritábilis bél szindróma (IBS-D).

Az ENTEROSGEL® szerves ásványi alapú orális béladszorbens (enteroszorbens), amely képes adszorbeálni bizonyos toxikus és káros anyagokat a bélben (pl. endotoxinokat és enterotoxinokat). Ezeket fizikailag megkötő a felületén, csökkentve a székletürítés gyakoriságát és lerövidítve a hasmenés időtartamát.

A széklettel együtt távozó ENTEROSGEL® eltávolítja a szervezetből a megkötött toxinokat és káros anyagokat, aminek jótékony hatása lehet a jelzett állapotok kezelésekor.

IBS-D-ben szenvedő betegeknek az ENTEROSGEL® enyhíti a hasmenést, a hasfájást, a puffadást és a székelési ingert.

Az ENTEROSGEL® nem tartalmaz tartósítószeret, glutént, cukrot, édesítőszeret, laktózt, zsírt, ízesítőszeret, sem növényi vagy állati eredetű összetevőket.

## 2. TUDNIVALÓK AZ ENTEROSGEL® ALKALMAZÁSA ELŐTT

**Ne alkalmazza az ENTEROSGEL®-t (ellenjavallatok):**

- Ha egyéb, módosított (szabályozott) felszívódású gyógyszert is szed száján át.
- Ha bélpangásban vagy bélezáródásban (bélcsavarodás miatti súlyos hasmenésben) szenved.
- A készítménnyel szembeni intolerancia esetén (korábbi alkalmazások alapján).

**Figyelmeztetések és óvintézkedések**

- Ne alkalmazza az ENTEROSGEL®-t száján át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után kevesebb mint 2 órával. Az ENTEROSGEL® befolyásolhatja egyes száján át szedett gyógyszerek felszívódását. Ha

gyógyszert szed, akkor orvosát vagy gyógyszerészét is megkérdezheti az ENTEROSGEL® alkalmazásával kapcsolatban.

- Hosszan tartó hasmenés esetén az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt orvoshoz kell fordulni az alapbetegség diagnosztizálása érdekében.
- Gyermekek esetén a hasmenés kezelését a szervezet dehidratálódásának megelőzése érdekében elegendő mennyiségű folyadék, illetve orális folyadékpótló oldat alkalmazásával kell kiegészíteni.
- Felnöttek esetén ajánlott az ENTEROSGEL®-kezelést folyadék vagy orális folyadékpótló oldat bevitelével kiegészíteni a megfelelő hidratálás biztosítása érdekében.
- A vitaminok, illetve tápanyagok esetleges adszorpciójának megelőzése érdekében ne lépje túl a kezelés ajánlott időtartamát, és ne alkalmazza a készítményt étkezéskor.
- Ha a hasmenés két napnál tovább tart, orvoshoz kell fordulni.
- Láz, véres széklet, dehidratálódás jelei, 24 órán belül hat vagy több székelés, egyidejű hasmenés és hányás, illetve erős vagy állandó hasfájás esetén mielőbb forduljon orvoshoz, különösen gyermekek esetében.
- Ne lépje túl sem a javasolt adagot, sem a kezelést javasolt időtartamát.
- Ha egyidejűleg egyéb béladszorbent, például aktívszén-, agyag- vagy kaolintartalmú készítményt is alkalmaz, akkor kérje ki orvosa véleményét. Orvosa azt tanácsolhatja, hogy a másik készítményt ne alkalmazza az ENTEROSGEL®-lel együtt.
- Az ENTEROSGEL® alkalmazása nem javallott akut vegyszermérgezés vagy gyógyszer-túladozás esetén.
- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után nem szabad felhasználni.

**Az ENTEROSGEL® alkalmazható terhesség és szoptatás alatt.** Amennyiben a terhesség vagy szoptatás alatt nem érzi jól magát, javasolt orvoshoz fordulni. Az ENTEROSGEL® alkalmazása előtt kérje ki orvosa véleményét.

## 3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ ENTEROSGEL®-T?

- Miután első alkalommal híg székletet tapasztal, alkalmazza az ENTEROSGEL®-t a megfelelő mennyiségben.
- Az ENTEROSGEL®-t legalább 2 órával a száján át szedett gyógyszerek alkalmazása előtt vagy után alkalmazza.
- Az ENTEROSGEL®-t legalább 1-2 órával étkezés előtt vagy után alkalmazza.
- Oldja fel az adagot szobahőmérsékletű vízben.
- A tasak csak közvetlenül a felnyitás után alkalmazhatók.
- Felnyitás és minden használat előtt jól rázza fel a tubust.
- A tubus a felnyitástól számított 30 napig használható



Életkor	Adagolás	Gyakoriság
<b>1 év alatt</b>	2,5 g (kb. ½ teáskanál) 7,5-15 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor
<b>1-6 év</b>	5 g (kb. 1 teáskanál) 50-100 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor
<b>7-14 év</b>	10 g (kb. 2 teáskanál) 50-100 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor
<b>15+ és felnöttek</b>	15-22,5 g (kb. 1 leveleskanál vagy 1-1,5 tasak) 200 ml vízben feloldva	Naponta 3-szor

# ENTEROSGEL®

Méregtelenítő készítmény

## Az ENTEROSGEL®-kezelés időtartama:

- Akut hasmenés esetén 3-5 nap.
- Hasmenéssel járó irritabilis bél szindróma esetén legfeljebb 30 nap. Az ismételt használat közötti szünetnek legalább 3 napnak kell lennie.
- A hároméves kor alatti alkalmazást illetően javasolt kikérni az orvos véleményét.
- A kezelés kezdetén (az 1. napon) az első adag a kétszeresére növelhető, és minden székelés után újabb egyszeri adag adható. Ne lépje túl a 8 adagot az első napon.
- Krónikus hasmenés kezelésekor a széklet állagának és a székelés gyakoriságának megfelelően módosíthatja az adagolást. Híg széklet esetén kétszeres adag is alkalmazható legfeljebb napi 3 alkalommal, normál széklet esetén pedig naponta egyszer 1 adag is elegendő lehet. A napi 6 adagot ne lépje túl.
- Ha 1-2 napig nincs széklete, akkor szakítsa meg az ENTEROSGEL® alkalmazását, növelje a folyadékbevitelt, és a következő székelés után folytassa a kezelést.

## 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Székrekedés, émelygés (hányinger)

## 5. AZ ENTEROSGEL® TÁROLÁSA

- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után az ENTEROSGEL®-t tilos alkalmazni.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Az ENTEROSGEL®-t 4 és 30 °C közötti hőmérsékleten kell tartani.
- Nem fagyasztható.
- Óvja a túl magas hőmérséklettől és a közvetlen napfénytől.
- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő a megfelelően tárolt, bontatlan termékre érvényes.

### Tasak

- A felflyított tasak csak egyszer alkalmazható.
- A tasakok egyszeri használatra szolgálnak; a tasakot csak közvetlenül az alkalmazás előtt nyissa fel.
- A mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében ne alkalmazza újra a részlegesen felhasznált tasakokat.

### Tubus

- Felflyítás és minden használat után szilárdan zárja vissza a tubus kupakját a kiszáradás és a mikrobás szennyeződés megelőzése érdekében.

Az ENTEROSGEL® kinyomásakor kis mennyiségű folyadék is távozhat a tubusból vagy a tasakból.

## 6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

**Összetétel:** polimetilsziloxán-polihidrát (a metil-kovász hidrogélje) – 70%, tisztított víz – 30%.

### Kiszerezések

- ENTEROSGEL® orális szuszpenzió
- 225 g-os tubus
- 90 g-os tubus
- 15 g-os tasak (10 tasakos csomagolás)

### ÁRTALMATLANÍTÁS

A felhasználatlan ENTEROSGEL® ártalmatlanítása nem igényel különleges intézkedést. A készítmény biztonságosan a háztartási hulladékba dobható. A csomagolás újrahasznosítható.

**Eltarthatóság:** a csomagoláson jelzett időpontig

Az ENTEROSGEL® készítménnyel kapcsolatos kérdéseit az [info@enterosgel.eu](mailto:info@enterosgel.eu) címre küldheti e-mailben.

A jelen betegájékoztató egyéb nyelvű változatai megtalálhatók a [www.enterosgel.eu](http://www.enterosgel.eu) címen.

### GYÁRTÓ:



Bioline Products s.r.o.  
Krakovská 1338/10,  
110 00 Praha, Cseh Köztársaság  
[www.enterosgel.eu](http://www.enterosgel.eu)

### MAGYARORSZAGI FORGALMAZÓ:

Anima-Terra Kft.  
Budapest, 1121 Ágnes út 25.  
[www.enterosgel.hu](http://www.enterosgel.hu)

### A BETEGTÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTETT VÁLTOZATÁNAK DÁTUMA:

08.08.2022

**VÁLTOZAT:** TUV/IFU/HU/NB/2

### A CSOMAGOLÁSON FELTÜNETETT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA:



Tilos újrafelhasználni



Tanúsított orvosi eszköz



Mínőségmegőrzési idő



Eldobható csomagolás

**LOT**

Tételkód



A használt csomagolást helyezze megfelelő hulladékgyűjtő tartályba. A csomagolás újrahasznosítható.



Gyártó



A csomagolásért be lett fizetve a megfelelő illeték a meghatalmazott csomagolóállalat számára.



Olvassa el a használati útmutatót



Óvja a közvetlen napfénytől



Hőmérsékleti határértékek  
4°C / 30°C

**CE 0123**

Orvosi eszköz IIa osztály